

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PLP 28-2-77347778

50
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE - GARD - HERAULT - LOZERE - PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE - BAT. 5 - PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX - TEL. 92.28.72

ABONNEMENT ANNUEL :

Régisseur de recettes de la D.D.A.

C.C.P. Montpellier 5238-57

50 Francs

N° 4 - 16 Février 1977

:
: ABRICOTIER :
:

Monilia

L'attention a déjà été attirée sur la nécessité d'une protection cuprique pendant le repos de la végétation. La floraison est la période la plus critique les attaques de monilia sont d'autant plus spectaculaires que les conditions climatiques sont favorables (pluies, humidité persistante) et que les arbres n'ont pas été taillés (Roussillon). L'installation d'une période humide favorisée par le vent ("le marin") est à l'origine de dégâts importants, si elle coïncide avec la floraison.

Les risques de dégâts imputables au monilia sont à redouter étant donné les conditions climatiques actuelles. La constitution de coussinets sporifères a été favorisée par les importantes pluies de Janvier et de Février, notamment dans le Gard. La dissémination des conidies risque d'être intense et les dommages élevés.

La lutte contre le monilia est préventive. Une, deux, voire trois applications successives peuvent être nécessaires du débourrement à la chute des pétales.

Produits recommandés :

La protection peut être réalisée dans un premier temps, à l'aide de produit cuprique, si elle est mise en place à l'apparition des sépales (taches rouges entre les écailles) bouillie bordelaise à 1,5 %, oxychlorure de cuivre, à 0,750 kg par hectolitre d'eau.

Après ce stade, il est indiqué de faire appel à des fongicides de synthèse qui sont mieux supportés par la végétation : folpel 100 g m.a./hl), mancozèbe (160 g m.a./hl), thirame (200 g m.a./hl).

En fin de la période dangereuse, mettre à contribution des fongicides à action systémique du type

bénomyl (30 g m.a./hl), méthylthiophanate (70 g m.a./hl),
thiabendazole (100 g m.a./hl).

Il est recommandé d'assurer la protection sur l'ensemble de la frondaison, en particulier aux extrémités des rameaux.

Les traitements contre le monilia ont une action secondaire mais cependant importante contre l'oïdium de l'abricotier.

: g./m.a./hl = grammes de matière active à l'hectolitre d'eau :
: Le bulletin n° 3 a été envoyé aux abonnés de la région de :
: CASTELNAUDARY et concernait le traitement à appliquer contre :
: les charançons de la tige (colza). :

L'INGENIEUR EN CHEF D'AGRONOMIE,
CHEF DE CIRCONSCRIPTION,

V. LAGAUDE

Tirage du 16 Février 1977 - 1.300 exemplaires.

Imprimerie de la Station d'Avvertissements Agricoles - Place Chaptal - Montpellier

Le Directeur : P. JOURNET - n° d'inscription PP 531 AD

7206